

ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO

Strutture di **Gruppo B** - Contenuto minimo del **pacchetto di medicazione**

- 1) Guanti sterili monouso (2 paia),
- 2) Flacone di soluzioni cutanea di iodopovidone al 10% da 125 ml (1flacone);
- 3) Flaconi di soluzione fisiologica(sodio cloruro-0,9%) da 250 ml (1flacone);
- 4) Compresse garza sterile 10x10 in buste singole (3 buste)
- 5) Compresse garza sterile 18x40 in buste singole (1busta)
- 6) Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- 7) Confezione di cotone idrofilo (1);
- 8) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- 9) Rotoli di cerotto alto cm.2,5 (1);
- 10) Rotolo di benda orlata alta cm.10 (1)
- 11) Un paio di forbici con punta arrotondata;
- 12) Lacci emostatici (1)
- 13) Ghiaccio "pronto uso" (1 confezioni)
- 14) Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari (2);

Strutture di **GRUPPO A I** – Contenuto della **cassetta di pronto soccorso**

- 1) Guanti sterili monouso (5 paia)
- 2) Visiera paraschizzi
- 3) Flacone di soluzioni cutanea di iodopovidone al 10% da 1 litro (1 flacone);
- 4) Flaconi di soluzione fisiologica(sodio cloruro-0,9%) da 500 ml (3 confezioni);
- 5) Compresse garza sterile 10x10 in buste singole (10 buste)
- 6) Compresse garza sterile 18x40 in buste singole (2 buste)
- 7) Teli sterili monouso (2) (non inferiori a 100x100cm);
- 8) Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- 9) Confezione di rete elastica misura media (1)
- 10) Confezione di cotone idrofilo (1);
- 11) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2 confezioni)
- 12) Rotoli di cerotto alto cm.2,5 (2);
- 13) Un paio di forbici con punta arrotondata ;
- 14) Lacci emostatici (3)
- 15) Ghiaccio "pronto uso" (2 confezioni)
- 16) Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari (2);
- 17) Termometro
- 18) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Integrazione al contenuto del pacchetto e della cassetta di pronto soccorso

1. Flacone di acqua ossigenata F.U. 10 volumi da 250 ml (1 flacone)
2. siringa senza ago da 30 o 50 ml monouso
3. preparato antiustione § solo per le strutture con laboratori chimici fisici e ingegneristici

Nota: è consigliabile acquistare più confezioni di minor volume rispetto a quelle indicate, es. 4-5 flaconi da 50 ml anziché un solo flacone da 250 ml di soluzione fisiologica. Dopo l'apertura la soluzione fisiologica non è più sterile e i disinfettanti perdono le loro caratteristiche.

Rinnovare le confezioni alla data di scadenza se integre, dopo 6 mesi dall'apertura se si tratta di confezioni già parzialmente utilizzate.

In attesa che l'infortunato riceva le cure del medico *Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione*

- Indossare i guanti prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione. Proteggono l'infortunato e il soccorritore dalle infezioni.

Ferita lieve

- Lavare la pelle intorno alla ferita con soluzione fisiologica o acqua corrente, per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge ecc servendosi della garza imbevuta eseguire movimenti semicircolari dal centro verso la periferia della ferita..
- Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.
- Applicare sulla ferita un poco di soluzione di iodopovidone; coprire con garza, appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda da fissare con un pezzettino di cerotto o applicare la rete elastica. Se si tratta di piccola ferita applicare un cerotto.

Emorragia

- Se dalla ferita esce molto sangue comprimerla con garza e cotone idrofilo. Se la perdita di sangue non si arresta dopo 10 minuti di compressione e la ferita si trova in un arto, applicare la fascia emostatica verso la radice dell'arto tra cuore e ferita fino all'arresto del sanguinamento e non oltre. Annotare l'ora di applicazione

Corpo estraneo negli occhi

- Nel caso di un corpo estraneo (solido o liquido) negli occhi. Lavare la lesione solo con acqua o soluzione fisiologica utilizzando la siringa senza ago da 30 o 50 ml. Coprire entrambi gli occhi con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.

Contusione o puntura d'insetto

- Nel caso di contusione o puntura di insetto applicare il ghiaccio; non applicarlo direttamente se la pelle non è integra.

Sangue dal naso

- In caso di sangue dal naso comprimere le narici per 10 minuti, bagnare la fronte con acqua fredda, raccomandare di non soffiarsi il naso e di non inclinare il capo all'indietro.

Scottature

- In caso di scottature raffreddare la parte interessata sotto l'acqua corrente, applicare con delicatezza sulla lesione un po' del preparato anti ustione, coprire con garza, fasciare senza stringere